



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Kódy pro ACHP/Polio dotazník k jednotlivým případům podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008)

Příloha č. 2 k článku ve wordu ke stažení

- (1) Příjmení a jméno pacienta. Musí být uvedeno v 1. hlášení. (V hlášení pro SZO za ČR je uváděn identifikační číselný kód, netýká se krajských hlášení).
- (2) Kraj, kde pacient trvale bydlí v době začátku onemocnění. Musí být uvedeno v 1. hlášení.
- (3) Okres, kde pacient trvale bydlí v době začátku onemocnění.
- (4) Pohlaví nemocného: 1=muž, 2=žena, 9=neznámé. Musí být uvedeno v 1. hlášení.
- (5) Datum: den/měsíc/rok (DD/MM/YYYY-čtyřmístnou číslicí rok, není-li znám přesně, použít co nejpřesnější odhad).
- (6) Datum narození. Musí být uvedeno v 1. hlášení i v případě, že není zcela přesné a bude opraveno.
- (7) Věk v letech. Dítě je "0" leté do 1. roku věku, "1" leté do 2. roku věku atd. Musí být uvedeno v 1. hlášení i když se jedná o "kvalifikovaný odhad" v případě, že není známo přesné datum narození.
- (8) Datum objevení se paréz. Musí být uvedeno v 1. hlášení i v případě pozdějšího upřesnění.
- (9) Počet dávek OPV v rámci pravidelného očkování na základě evidence či ústní informace.
- (10) Počet dávek OPV v rámci doplňkové vakcinace (je-li znám).
- (11) Datum poslední dávky OPV.
- (12) Datum, kdy je případ poprvé hlášen příslušnému epidemiologovi.
- (13) Datum zahájení epidemiologického vyšetřování.
- (14) Datum odběru 1. vzorku stolice.
- (15) Datum odběru 2. vzorku stolice.
- (16) Lokalizace paréz: 0=izolovaná paréza n.VII., 1=končetiny, 2=končetiny a dýchací svaly (bulbární), 3=bulbární paréza, 4=končetiny + paréza n.VII., 9=není známo.
Musí být uvedeno v 1. hlášení i v případě pozdějšího upřesnění.



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

- 17) Teplota při objevení se paréz: 1=ano, 2=ne, 9=není známo.
- 18) Rychlý postup paréz (během 4 dnů): 1=ano, 2=ne, 9=není známo.
- 19) Asymetrická paréza: 1=ano, 2=ne, 9=není známo.
- 20) Datum dalšího klinického vyšetření.
- 21) Vyšetření po 60 dnech: 1=reziduální slabost, 2=bez reziduální slabosti, 3=unikl sledování, 4=zemřel před vyšetřením.
- 22) Laboratorní číslo protokolu pro 1. stolici (vyplní NRL).
- 23) Poliovirus izolován (P1=typ1, P2=typ2, P3=typ3): 1=ano, divoký kmen, 2=ano, vakcinální kmen, 3=ano, typizace probíhá, 4=směs divoký/vakcinální, 5=neizolován, 6=vzorek nevyšetřen.
- 24) Izolace enteroviru: 1=ano, 2=ne, 3=nevyšetřeno.
- 25) Konečná klasifikace: 0=ne AFP (spastická nebo chronická paréza, izolovaná paréza n.VII.), 1=potvrzená polio (klinicky nebo virologicky), 2=vyřazeno jako polio, 3=klinicky shodná s polio ("polio compatible" dle SZO klasifikace), 4=podezření na VAPP (klinicky shodná s polio v možné souvislosti s vakcinací), 5=potvrzena VAPP (potvrzená souvislost s vakcinací), 6=přesetřeno komisí, klasifikace závisí na dalších klinických údajích, 7=import polio, 8=import polio compatible.
- 26) Konečná klinická diagnóza po 60 dnech od začátku paréz: viz příloha - **ICD kódy** (Seznam klinických diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nemocí): 0=ne AFP (izolovaná paréza n.VII. jakéhokoli původu, spastická nebo chronická paréza, meningitis, koma atd.), 1=připomínající poliomyelitidu (poliovirová nebo jiná enterovirová), 2=Polyradiculoneuritis/Guillain-Barré sy/Landry sy, 3=transversální myelitis, 4=traumatická neuropatie, 5=tumor míchy (akutní komprese míchy -



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

neoplasma, hematom, absces) nebo jiný tumor, 6=Periferní neuropatie v důsledku infekce (diftérie, borrelióza, klíšřová encefalitida) nebo intoxikace (hadí uštknutí, těžké kovy, insekticidy), 7=jiná specifická neurologická onemocnění, 8=systémové nebo metabolické onemocnění, onemocnění svalů nebo kostí, 9=paréza neznámé etiologie nebo s neurčenou diagnózou.

27) Prioritní vyšetřeni: 0=ne, 1=klinické známky polio, 2=méně než 3 dávky polio vakcíny, 3=pobyt v polio-endemické zemi v průběhu 30 dní před začátkem paréz, 4=vysoce riziková skupina (bezdomovec, utečenec aj.), 9=není známo.

Musí být uvedeno v 1. hlášení, později je možná oprava.

28) Komentář: důležité poznámky související s vyšetřovaným případem.

29) Počet dávek IPV, pokud došlo k aplikaci a datum poslední dávky IPV.

30) Aseptická meningitida: 1=ano, 2=ne, 9=není známo.

Poznámky:

- 1) paretické onemocnění v souvislosti s nepoliiovírovými enteroviry klasifikovat (25)=2, klinicky (26)=1 s laboratorním výsledkem v bodě (24), který to potvrzuje.
- 2) pokud je hlášena izolovaná paréza n.VII., uvést v bodě (16)=0, klasifikovat (25)=0, klinicky (26)=0.
- 3) každý případ hlášený s lokalizací (16)=0 nebo s klasifikací (25)=0 by neměl být zahrnut do celkového počtu případů ACHP nebo počtu nepoliiovírových ACHP.
- 4) i když surveillance ACHP by měla zahrnovat vyšetřování a sběr vzorků stolic od případů se suspektní poliomyelitidou bez ohledu na věk, SZO zpracovává v tabulkách údaje pouze u dětí do 15 let věku (=0-14).