



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Očkování proti spalničkám

Informace o očkování proti spalničkám.

Plošné pravidelné očkování proti spalničkám bylo na území bývalého Československa zahájeno v roce 1969 aplikací jedné dávky vakcíny proti spalničkám.

Od roku 1975 bylo očkování rozšířeno na dvoudávkové schéma.

V současné době platí následující očkovací schéma dle platné legislativy dané vyhláškou MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem v platném znění:

- První dávka je aplikována dětem od 15. měsíce věku
- Druhá dávka za 6 - 10 měsíců po první dávce.

V ČR je registrována kombinovaná živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR - measles, mumps, rubella).

V ČR není vakcinace dospělých osob proti spalničkám součástí doporučených očkování pro dospělé populaci ([www.svl.cz](http://www.svl.cz), [www.vakcinace.eu](http://www.vakcinace.eu)).

Dle materiálů CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) je pro dospělé vnímavé osoby ve věku 19 let a starších doporučeno očkování 1 nebo 2 dávkami vakcíny MMR dle SPC registrované vakcíny.

*Zdroj: Advisory Committee on Immunization Practices Recommended Immunization Schedule for Adults Aged 19 Years or Older: United States, 2014*