



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Informace o nákaze virem Zika - aktualizace k 25.1.2016

Převzato ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR.

Infekce Zika virem je přenášena komáry. Zika virus (ZIKAV), byl poprvé identifikován v roce 1947 v lese Zika v Ugandě.

Mezi hlavní symptomy infekce ZIKA patří:

- zvýšená teplota (<math> < 38,5 \text{ } ^\circ \text{C}</math>)
- přechodné artritida / artralgie s možnými otoky kloubů především v menších kloubech rukou a nohou
- makulopapulární vyrážka často se šířící z tváře na tělo
- překrvení spojivek nebo bilaterální nehnisavý zánět spojivek
- obecné nespecifické příznaky (jako myalgie, slabost a bolesti hlavy).

Inkubační doba se pohybuje od 3 do 12 dnů. Příznaky onemocnění jsou obvykle mírné a trvají 2 až 7 dní.

Cestou WHO bylo MZ informováno o dalších laboratorně potvrzených případech nákazy virem Zika v Guyaně, Ekvádoru a Barbadosu.

V Guyaně byl hlášen 1 potvrzený případ nákazy způsobený virem Zika. Jedná se o ženu ve věku 27 let z oblasti Berbice.

V Ekvádoru bylo hlášeno 6 laboratorně potvrzených případů (2 případy - jedním případem je žena ve věku 23 let z oblasti Guayaquil a druhým případem je muž ve věku 15 let z Portoviejo) a dále 4 případy importované (3 případy z Kolumbie a 1 případ z Venezuely).

V Barbadosu byly hlášeny 3 laboratorně potvrzené případy, žádný z těchto případů neměl pozitivní cestovní anamnézu.

Dále několik zemí či oblastí potvrdilo přenos Zika virové infekce v uplynulých devíti měsících na svém území a to: Barbados, Bolívie, Brazílie, Cape Verde, Kolumbie, Ekvádor, El Salvador, Fidži, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Maledivy, Martinique, Mexiko, Nová Kaledonie, Panama, Paraguay, Portoriko, Saint Martin, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Surinam, Thajsko, Venezuela.

Celkem bylo v Brazílii hlášeno 3 530 případů mikrocefalií podezřelých z infekce nákazy virem Zika. Z toho bylo evidováno 46 případů úmrtí.

Informace pro cestující:

V současné době jsou oblasti výskytu s rozsáhlým přenosem Zika virové infekce a oblasti s ojedinělým přenosem Zika virové infekce:



El Salvador, Venezuela, Kolumbie a Brazílie Surinam, Francouzská Guyana, Honduras, Mexiko, Panama a Martinik v současné době zažívají rychle se vyvíjející epidemii s rozsáhlým přenosem Zika virové infekce

Bolívie, Guyana, Ekvádor, Guadeloupe, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Barbados, Svatý Martin a Haiti, kde byly hlášeny jen ojedinělé přenosy Zika virové infekce

Pokud budete cestovat do těchto oblastí zasažených virem Zika je nutné přijmout následující opatření:

- Individuální ochranná opatření, aby se zabránilo bodnutí komárem. Používat po celý den repelenty a to zejména v průběhu dopoledne až do večera.
- Cestující, kteří mají poruchy imunity nebo vážné chronické onemocnění -poradit se s obvodním lékařem před cestou do postižených oblastí.
- Těhotné ženy a ženy, které se snaží otěhotnět a plánují cestovat do oblastí, kde dochází k rozsáhlému přenosu Zika virové infekce je nutné diskutovat cestovní plány se svým lékařem a zvážit nutnost cesty.
- Oblečení -nosit košile s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty.
- Používat sítě proti komárům
- Cestující, kteří vykazují příznaky kompatibilní s dengue, chikungunya nebo Zika virovým onemocněním do tří týdnů po návratu z postižené oblasti by měli kontaktovat svého lékaře.

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-o-nakaze-virem-zika-aktualizace-k-25-1-2016_11353_5.html

v Praze dne: 25.1.2016

Zdroj : Světová zdravotnická organizace (WHO)