


**Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry
2.4.2012**

Souhrn:

Situace v Evropě je ve znamení klesající či setrvalé nemocnosti, ve více jak 20 státech EU došlo k poklesu. Stále dominuje A(H3N2), ale podíl B chřipky se doposud mírně zvyšuje. Pozoruhodný je vývoj pozitivit chřipkových záchytů v sentinelových odběrech, který klesá velmi pomalu a nyní stagnuje. V každém případě se stále drží na poměrně vysoké úrovni – více jak 40% pozitivních průkazů chřipky ze všech vyšetřených sentinelových výtěrů. V žádném z dosud testovaných evropských izolátů chřipky nebyla prokázána rezistence na inhibitory neuraminidázy. V ČR v NRL pro chřipku byly zachyceny a izolačně potvrzeny 2 kmeny B typu z nevakcinální linie B/Yamagata (oba z ambulantních odběrů z Královéhradeckého kraje), naprostá většina našich B izolátů však odpovídá vakcinální variantě. Avšak v Evropě je tento poměr skoro vyrovnaný – 57,1% B/Victoria, 42,9% B/Yamagata. V ČR již došlo k poklesu nemocnosti v kategorii ARI i ILI, nicméně záchytnost ve virologických vyšetřeních je stále poměrně vysoká. K dnešnímu dni má NRL pro chřipku 50 identifikovaných kmenů chřipky obou typů a další značné množství aglutinujících izolátů, aktualizace tabulky bude provedena v příštím týdnu.

¹⁾

Záchytnost virů chřipky A a B (v procentech) v sentinelových vzorcích nahlášených do TESSy od 40. KT 2011 (zdroj dat: týdenní hlášení WISO)



*MUDr Martina Havlíčková
NRL pro chřipku*

¹⁾ Počet vyšetření a pozitivních záchytů respiračních virů v excelové tabulce ARI není kompletní, protože některá hlášení jsme dosud nedostaly. 13. KT bude proto aktualizován v týdnu následujícím.