


Situace v Evropě: zvolna ustupující epidemie chřipky, v současné době se více uplatňuje chřipka typu B, především u ambulantně ošetřených pacientů. U hospitalizovaných pacientů a osob s těžkým průběhem chřipkové infekce převažuje typ A. V ČR je z tohoto hlediska situace obdobná (viz níže). V sentinelovém systému je pozoruhodně setrvalý vývoj v procentu pozitivních záchytů (za uplynulý KT to je 49%), nicméně celkový počet indikovaných vyšetření stále klesá.



Zdroj: www.flunewseurope.org

Situace v ČR: v programu sentinelové virologické surveillancie převažuje – podobně jako v Evropě – chřipka typu B, u hospitalizovaných pacientů je etiologickým agens spíše chřipka typu A, subtyp A/H1. Celková hodnota nemocnosti ARI dosáhla za 12. KT 1080 nemocných na 100 000 obyvatel, oproti minulému KT je evidován pokles o 13%. K poklesu nemocnosti v kategorii „ARI“ došlo ve všech krajích. Pokles nemocnosti o 23,4% byl zaznamenán i v kategorii „ILI“ – tedy chřipce podobným infekcím. I zde je vidět pokles ve všech krajích - s výjimkou Pardubického.

Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od 1.9.2015 do 23.3.2016: v ČR bylo v uvedeném období hlášeno celkem **234 klinicky závažných** případů chřipky, z nichž v **53 případech došlo k úmrtí**. Jako etiologické agens byl v 11 případech prokázán virus chřipky typu B, ve 100 případech se jednalo o virus chřipky A, ve 115 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2 a ve dvou případech se jednalo o duální infekci s průkazem viru chřipky typu B a A/H1N1. U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a vesměs nebyli očkovaní proti chřipce popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval od 5 měsíců – 91 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo v 89 případech o ženy a ve 145 případech o muže. Ve 192 případech byla podána antivirotika.

Závěr: ustupující epidemie chřipky spíše lokálního charakteru. Dominujícím kmenem je chřipka typu B spolu s chřipkou A/H1N1.

M.Havlíčková, J.Kynčl