

Evropa:

Pandemie SARS-CoV-2 ovlivňuje jak evropské hlášení, tak hlášení v ČR. Pozornost je dominantně upnuta na testování nového koronaviru a proto lze považovat veškerá data za podhlášená.

V evropském regionu byla zvýšená aktivita chřipky zaznamenána již ve 47. týdnu roku 2019. Během sezóny kocirkulovaly oba subtypy chřipky A (A/H1N1pdm a A/H3N2) spolu s linií B/Victoria. Jednotlivé subtypy se v různých zemích Evropy uplatňovaly s různou mírou.

Česká republika: ve 20. kalendářním týdnu je **nemocnost obvyklých akutních respiračních infekcí** na sezónní úrovni. Incidence chřipky je v posledních týdnech minimální, nyní evidujeme pouze zcela sporadické případy a opět se více prosazují nechřipková respirační agens.

V sentinelu nebyl v květnu do NRL zaslán žádný vzorek, ve stejném období byly v rámci nesentinelu vyšetřeny 3 vzorky na jiné respirační viry než SARS-CoV-2. Jak vyplývá z hlášení spolupracujících zdravotnických zařízení, i zde bylo na jiné respirační viry vyšetřeno pouze 39 vzorků s negativním výsledkem, z 18 spolupracujících pracovišť ovšem zaslalo přehled o vyšetření pouze 7.

Informace o incidenci ARI budeme zasílat ve dvoutýdenním cyklu tak jako v předchozích sezónách.

Děkujeme všem za spolupráci v rámci běžné surveillance ARI/ILI, pokračujeme v surveillance nejen nového koronaviru a jakékoliv laboratorní výsledky uvítáme i v nadcházejícím „meziobdobí“. Současně uvítáme všechny materiály pozitivní na SARS-CoV-2 s Ct menším než 25.

RNDr. Helena Jiřincová, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ