


**Situace v ČR:**

odpovídá sezóně, stále prevalují především nechřipková respirační agens, zejména rinoviry, jež dominují a tvoří téměř třetinu všech pozitivních výsledků. Druhým nejčastějším agens je parainfluenza.

Z materiálů z kraje Vysočina (Jihlava) byla v NRL zachycena chřipka typu A u 17 letého muže (T 40°C, typické chřipkové příznaky a zvracení). Subtypizace a izolační pokus probíhají. Jedná se o ambulantního pacienta a je to první záchyt chřipky typu A v sentinelu v letošní sezóně.

**Situace v Evropě:**

během 46. KT bylo v Evropě celkem nahlášeno vyšetření 60 chřipka pozitivních sentinelových vzorků, 36 náleželo do typu A a 24 výtěrů z této skupiny se podařilo subtypovat: 38 % bylo zařazeno do subtypu H1N1 a 62 % do subtypu H3N2. Chřipka B byla prokázána 24x a všechny vzorky byly zařazeny do linie Victoria. Ve 46. KT celková záchytnost dosáhla 6,6 % (60 pozitivních z 910 vyšetřených). Dosavadní evropské sledování znázorňuje následující graf:



Zdroj: [www.flunewseurope.org](http://www.flunewseurope.org)

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ