

Situace v Evropě, 19. KT

Aktivita chřipky přetrvává na mezisezónní úrovni. V rámci ECDC končí sezóna i pravidelné týdenní hlášení.

Za 19. KT bylo v rámci sentinelového vyšetření pacientů s příznaky ARI/ILI testováno 637 vzorků, z nichž jeden byl pozitivní na virus chřipky. V non-sentinelových vzorcích je nadále sporadicky detekován virus chřipky A i B. Nebyl hlášen případ hospitalizace s laboratorně potvrzenou chřipkou.

Kvalitativní indikátory

Intenzita: z 37 zemí hlásí 33 aktivitu chřipky na „baseline“ úrovni, 4 země hlásí nízkou intenzitu (Ázerbájdžán, Kosovo, Slovensko, Ukrajina).

Zeměpisné rozšíření: z 38 zemí hlásí 33 nulovou aktivitu a 5 zemí hlásí sporadický výskyt (Ázerbájdžán, Portugalsko, Slovensko, Anglie, Skotsko).

- Internetové stránky WHO: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Internetové stránky ECDC: <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china>

Situace v ČR v 20. KT

V rámci surveillance nebyl do NRL zaslaný žádný vzorek. Dodatečně za 19. KT hlásíme detekci jednoho lidského rhinoviru a jednoho sezonního koronaviru.

Rovněž jsme konfirmovali detekci viru chřipky v 15KT H1N1, bohužel s negativním výsledkem. Proto upravujeme i virologickou ARI tabulku. Lze tedy konstatovat, že v letošní sezóně nebyl virus chřipky detekován v rámci surveillance a nesentinelového vyšetření.

Celkem bylo v tomto KT ve spolupracujících laboratořích vyšetřeno 58 vzorků na respirační viry, v nichž byl detekován jeden adenovirus, čtyři sezonní koronaviry a tři lidské rhinoviry.

Závěr: Přetrvává trvale nízký záchyt běžných respiračních virů, s mírnou dominancí rhinovirů, ojedinělými záchyty RSV a v jarních měsících rovněž běžných lidských koronavirů.

Zpracovali:

Timotej Šúri, MSc. a RNDr Helena Jiřincová

NRL pro chřipku a nechřipkovou respirační virovou onemocnění