

AKTUALITY

LATEST NEWS

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění

24. 11. 2014

Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

aktualizace 1. 12. 2014

Martina Havlíčková

Situace v ČR

Situace je v ČR epidemiologicky stále zcela klidná a odpovídající sezóně. Pozitivní záchyty jsou především adenoviry, často ve smíšeném infektu s bocaviry, cirkulují i viry parainfluenzy.

Izolovaný kmen chřipky subtypu A/H3N2 byl sekvenací určen jako A/Texas 50/2012 (tak jako většina evropských H3 izolátů), kláda 3C.3a.

Situace v Evropě

Je stále stabilizovaná a na neepidemické úrovni. Počet pozitivních průkazů chřipky v surveillanc systému se již několik týdnů pohybuje na 2 %, jak ukazuje linie v grafu. V sentinelových výtěrech bylo prokázáno 66 % subtypu A/H3N2, 9 % A/H1N1, 16 % B a 9 % A, kde nebylo možné prokázat subtyp. V nesentinelových výtěrech naopak převažuje B (28 %), ačkoliv je prakticky na stejné úrovni s A/H3N2 (27 %). Subtyp A/H1N1 je i zde minoritní (12 %).

Není hlášeno žádné nové úmrtí ani vyšší počet těžkých průběhů chřipkové infekce.

A/H5N8

Nejsou evidována žádná nová ohniska. Zasažené chovy byly již zlikvidovány či tento proces probíhá. Všechny osoby, které se účastní práce v ohnisku, jsou následujících 10 dní

sledovány. Do dnešního dne však nebylo vyslovené žádné podezření na lidskou infekci. Zdroj infekce pro drůbež je stále neznámý a je otázkou, zda se ho vůbec podaří objasnit.

AKTUALIZACE KE DNI 1. 12. 2014

Situace v ČR

Situace je v ČR epidemiologicky stále klidná a odpovídající sezóně. Jednoznačně převažují nechřipková virová agens, zejména adenoviry.


Situace v Evropě

Aktivita chřipkových virů v Evropě je, stejně jako v předchozích týdnech, nízká.

V sentinelovém systému dosahují záchyty chřipky nyní 3 %, posun je tedy minimální. Vyskytují se oba subtypy chřipky A i typ B. V sentinelových odběrech převažuje chřipka A, subtyp A/H3N2. U nesentinelových odběrů převažuje rovněž chřipka A. Podíl H1 a H3 je však skoro vyrovnaný. Predikce dominujícího epidemického kmene není jednoznačná, nicméně stále se jeví jako nejpravděpodobnější subtyp A/H3N2.

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
SZÚ –CEM

Graf: PRŮKAZ CHŘIPKY V SENTINELOVÝCH ODBĚRECH V EVROPSKÉM PROGRAMU



Zdroj: <http://www.flunewseurope.org/>