

Errata k článku: Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018

Errata: Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, in 2018

Petr Petráš

Tabulka 1: Případy Syndromu toxického šoku registrované v NRL/St v roce 2018 a do května 2019

č.	pohlaví	věk (let)	nemocnice	datum	forma	odebraný materiál	TSST-1	enterotoxin
1	žena	21	Plzeň	I. 2018	menstruální	tampon	TSST-1	A
2	žena	17	Prostějov	I 2018	menstruální	tampon	TSST-1	–
3	žena	14	Plzeň	II. 2018	menstruální	tampon	TSST-1	A
4	žena	20	Č. Budějovice	VI. 2018	menstruální	tampon	TSST-1	A
5	žena	15	Č. Budějovice	VI. 2018	menstruální	pochva	TSST-1	–
6	žena	15	Olomouc	VI. 2018	menstruální	moč	TSST-1	–
7	žena	35	Hradec Králové	VI. 2018	menstruální	pochva	TSST-1	A
8	žena	26	Č. Budějovice	IX. 2018	menstruální	kroužek IUD	TSST-1	A
9	muž	9	Praha - FTN	X. 2018	pyodermie	stěr z buly na kolenu DK	TSST-1	A
10	muž	0	Hradec Králové	XI. 2018	pyodermie	absces na hýždí	TSST-1	A
11	žena	4	Hradec Králové	XI. 2018	popálenina	zhnisaná popálenina	TSST-1	–
12	muž	18	Praha – Homolka	XI. 2018	pooperační RI	stěr rány v nose	TSST-1	–
13	žena	16	Strakonice	XII. 2018	menstruální	pochva	TSST-1	A
14	žena	21	Praha – ÚVN	XII. 2018	menstruální	pochva	TSST-1	–

2019

č.	pohlaví	věk (let)	nemocnice	datum	forma	odebraný materiál	TSST-1	enterotoxin
1	muž	4	Hradec Králové	I.2019	pyodermie	stěr morfy	–	C
2	žena	14	Hradec Králové	II. 2019	menstruální	tampon	–	A + B
3	žena	19	Nové Město n.M.	III. 2019	menstruální	tampon	TSST-1	
4	žena	17	Ostrava	IV. 2019	menstruální	tampon	TSST-1	A
5	muž	72	Ústí n.Labem	V. 2019	RI – pouřazová	hemokultura	–	C + D

RI = ranná infekce

V článku z únorového čísla našeho časopisu – Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(2): 59–63 byly nesprávně uvedeny údaje v položce 13 v tabulce 2 na straně 60. Správně platí, že se jednalo o menstruální syndrom toxického šoku (STŠ) u 16leté ženy hospitalizované v nemocnici Strakonice. Kmen *S. aureus* s produkcí TSST-1 v kombinaci s enterotoxinem A byl izolován z pochvy pacientky. Poslala nám ho i s dotazníkem paní primářka Šimečková, které se tímto omlouváme.

Uvádíme opravenou tabulku, ke které jsme přidali data z pěti případů STŠ zaregistrovaných v NRL/St v letošním

roce. Jednalo se o 3 případy menstruální formy u žen v rozmezí 14–19 let (u všech bylo v anamnéze používání vaginálních tamponů). Dále 2 případy, kdy STŠ byl komplikací jiného stafylokokového onemocnění. Prvním pacientem byl 4letý chlapec, u kterého byly původní infekcí zhnisané morfy při varicele. Druhým byl 72letý muž, kterému zhnisala rána po úrazu na prstech dolní končetiny. V obou případech, a též u jednoho menstruálního, byl etiologickým agens kmen *S. aureus* s produkcí enterotoxinů.

Petr Petráš
NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ